

مقایسه کنترل شده سیستم های مغزی - رفتاری بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبیت شده با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی

زهره ابراهیم زاده^{۱*}، سید عباس حقایقی^۲

۱. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

۲. استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

(تاریخ وصول: ۹۶/۰۳/۲۹ – تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۳/۱۷)

The Controlled Comparison of Brain-behavioral Systems between Patients with Stabilized Methadone, Non-stabilized Methadone and Non-stabilized Methadone and other Drugs

Zahra Ebrahimpour¹, * Sayed Abbas Haghayegh²

1. M.A in Clinical Psychology, Islamic Azad University of Najafabad , Najafabad , Iran.

2. Assistant professor of Psychology, Islamic Azad University of Najafabad , Najafabad , Iran.

(Received: Mar. 08, 2018 - Accepted: Jun. 19, 2018)

Abstract

چکیده

Aim: The aim of this study was the comparison of the Gary-Wilson brain-behavioral (activation, inhibition and fight-/flight) systems between patients with diagnosed opioid use disorder on the methadone maintenance treatment (MMT). These are consisting in three groups: stabilized and non-stabilized including methadone or other drugs (except methadone) abusers. **Method:** This research was a comparative and statistical population has been all of the clients registered on Esfahan MMT caring units. Sample groups have included of the stabilized (60), non-stabilized methadone (57) and other-drug-abuser (57) individuals who answered to the related questionnaire. Statistical data has been analyzed by SPSS-18 through analysis of the Covariance (MANCOVA). **Findings:** Analysis of the data showed that there were not significant differences in brain activation system, brain inhibition system and fight/flight system between three groups. **Conclusion:** Despite of no significant difference of these brain systems between three groups, but are differences between non-stabilized methadone groups in comparison to other two groups.

Keywords: brain-behavioral systems, addiction, methadone.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه کنترل شده سیستم های مغزی رفتاری گری-ویلسون (شامل فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ - گریز) بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبیت شده (درمان شده) با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی (همزان مصرف متادون و سایر مواد) بوده است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش مقایسه ای بوده و جامعه آن را کلیه افراد معتمد مرکز ترک اعتیاد شهرستان خمینی شهر در سال ۱۳۹۵ تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر مرد در گروه ثبیت شده با متادون، ۵۷ نفر مرد در گروه وابسته به متادون، و ۵۷ نفر مرد در گروه وابسته ترکیبی بودند که در مورد آنها پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری گری-ویلسون (۱۹۸۹) مربوطه اجرا شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده نرم افزار SPSS-18 و روش تحلیل کوواریانس (به منظور کنترل برخی از ویژگی های جمعیت شناختی) تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین شش بعد سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ - گریز در سه گروه وجود ندارد. با این حال، سطح معناداری مولفه خاموشی در مقایسه با سایر مولفه های سیستم های مغزی - رفتاری به سطح معناداری نزدیکتر بوده و در گروه ثبیت شده با متادون پایین تر از دو گروه دیگر بوده است. نتیجه گیری: اگرچه بین مولفه های در بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد با این حال، تفاوت هایی بین سه گروه، خصوصاً بین گروه وابسته به متادون با دو گروه دیگر وجود دارد.

واژگان کلیدی: سیستم های مغزی - رفتاری، اعتیاد، متادون.

مقدمه

ممکن است به صورت عود^۹های مکرر و ولع شدید نسبت به مواد در هنگام مواجهه فرد با محركهای مرتبط با مواد نمایان شود (پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ۲۰۱۳؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۹۴).

پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که مغز انسان، در اثر اعتیاد به مواد، دچار آسیب‌های جدی می‌شود، تا حدی که می‌توان اعتیاد را یک بیماری مغزی دانست (فرهودیان، ۱۳۹۰). نه تنها اثر مستقیم مواد بر مغز به دلیل تغییرات اشتها، تغییر سیکل طبیعی خواب، صرف زیاد وقت و هزینه مالی و اثر مستقیم خود ماده و ناخالصی‌های موجود در آن بر اعضای بدن، فرد را نسبت به وضعیت تغذیه و بهداشت خود بی‌تفاوت نموده و باعث بروز اختلالات مختلف روان‌پزشکی و بیماری‌های جسمی می‌شود، بلکه فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر فرد معتاد نیز به عنوان یک استرس بروز و وقوع اختلالات متعدد روان‌پزشکی را نیز موجب می‌گردد (سالیوان^۷، ۲۰۰۵). از این رو اهمیت روز افرون تبیین رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاری‌ها، پژوهشگران را ترغیب نموده که برای طرح و آزمون فرضیه‌های خود در این زمینه چشم‌انداز وسیعتری را در نظر داشته باشند. در سال‌های اخیر "عصب‌روانشناسان"

بر اساس پنجمین ویرایش کتابچه طبقه‌بندی اختلالات روانی^۱، ویژگی اصلی اختلالات مصرف مواد مجموعه‌ای از نشانه‌های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی است که علی‌رغم مشکلات قابل ملاحظه‌ای که برای فرد به وجود می‌آید، مصرف مواد ادامه پیدا می‌کند. در افراد شدیداً معتاد، تغییراتی در مدارهای مغزی به وجود می‌آید که امکان دارد بعد از مسمومیت زدایی نیز ادامه یابد. پیامدهای رفتاری این تغییرات مغزی ممکن است در برگشت‌های مکرر و اشتیاق شدید به مصرف دارو خود را نشان دهد (انجمن روانپزشکی آمریکا^۲، ۲۰۱۳). از آنجایی که وابستگی به مواد، اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه دارد، تهدیدی جدی و نگران کننده به حساب می‌آید که با پیشاندهای زیستی، فرهنگی، روانی، اجتماعی، رفتاری و معنوی ارتباط دارد (والاس^۳، ۲۰۰۳؛ بروک و اشپیتز^۴، ۲۰۰۱).

یک ویژگی مهم اختلالات مصرف مواد، بالاخص در مبتلایان به اختلالات شدید، بروز تغییرات اساسی در مدارهای مغزی است که ممکن است پس از ترک کامل از ماده مصرفی و یا تغییر نوع مصرف، باز هم باقی بمانند (باون و نیومن^۵، ۲۰۱۷). اثرات رفتاری این تغییرات مغزی

-
1. Psychological disorders
 2. American Psychiatric Association
 3. Valas
 4. Bruck and Schpites
 5. Bowen and Numann

هیجان منفی اضطراب و مقابله منفعانه و ضعیف در موقعیت‌های استرس‌زا می‌شود. این سیستم در واقع مسئول بازداری و افزایش بربایی و توقف رفتارهایی است که تنبیه به دنبال دارد دو مؤلفه رفتاری این سیستم عبارتند از: اجتناب منفعل^{۱۰} و خاموشی^{۱۱} است (سامر، موریتسو ویلفردو^{۱۲}، ۲۰۱۵). سومین سیستم، سیستم جنگ و گریز^{۱۳} است که به محرك‌های آزارنده غیرشرطی حساس است. دو مؤلفه رفتاری این سیستم که فعالیت زیاد آن با روان‌پریشی ارتباط دارد ستیز و گریز است (Desjardins، Zeleneski و Coplan^{۱۴}، ۲۰۰۸).

در چارچوب آسیب‌شناسی روانی نیز، گری با طرح نظریه "نظام‌های مغزی رفتاری" اختلالات را بازتاب بیش یا کم واکنشی در یکی از نظام‌ها؛ نارسایی در یک نظام؛ ترکیب‌های بیش/کم واکنشی و یا نارسایی در بیش از یک نظام؛ و یا نارسایی در تعامل‌های بین نظام‌ها می‌داند (آلوي و آبرامسون^{۱۵}، ۲۰۱۰؛ آلوي و همکاران، ۲۰۰۸). شواهد تجربی در مورد بررسی سیستم‌های مغزی- رفتاری در انواع اختلالات و به خصوص در حوزه اعتیاد رو به افزایش است (پارک^{۱۶} و همکاران، ۲۰۱۳؛ خسروانی، سیدسارونی و الوانی، ۲۰۱۶). در زمینه اعتیاد،

تلاش‌های گسترده‌ای را برای دستیابی به تفاوت‌های فردی زمینه‌ساز رفتارهای بزهکارانه ترتیب داده‌اند و به جستجوی مبانی "زیستی عصبی" تفاوت‌های مورد اشاره مبادرت ورزیده‌اند (گرین، نیستروم، اینگل، دارلی و کوهن^{۱۷}، ۲۰۰۴).

پژوهش‌های زیادی از نقش ویژگی‌های شخصیتی در شروع، تداوم و درمان اعتیاد وجود رابطه بین ابعاد مختلف شخصیت با گرایش به سوء مصرف مواد حمایت کردند (جوس، فلور و فرانسیسکا^{۱۸}؛ کلی^{۱۹} و همکاران، ۲۰۰۶). الگوی "عصب روانشناختی" مطرح شده نظریه شخصیت گری در قالب نظریه سیستم‌های مغزی رفتاری، بر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایندهای مغزی توجه دارد (الی، زو و چن^{۲۰}؛ ۲۰۱۵)، پاسکالیس، آرویا، ماتیوسیو مازوکو^{۲۱}، ۲۰۰۵). وی در نظریه حساسیت به تقویت، الگویی زیستی از شخصیت ارائه می‌دهد که شامل سه سیستم مغزی- رفتاری است. نخستین سیستم در این الگو، سیستم فعل ساز رفتاری^{۲۲} است که فعالیت آن باعث تجربه هیجان مثبت (لذت)، روی‌آوری^{۲۳} و اجتناب فعل^{۲۴} می‌شود. سیستم بازداری رفتاری^{۲۵} دومین سیستم است که فعالیت آن باعث تجربه

1. Green, Nystrom, Engell, Darley and Cohen

2. Jose, Flor and Francisca

3. Kelly

4. Li, Xu & Chen

5. Pascalis, Arwae, Matteucci and Mazzocco

6. Behavioral Activation System

7. Approach

8. Active avoidance

9. Behavioral Inhibition System (BIS)

10. Passive avoidance

11. Extinction

12. Sommer, Maurits and Vilfredo

13. Fight/Flight/Freezing System (FFFS)

14. Desjardins, Zeleneski and Coplan

15. Alloy and Abramson

16. Park

زهرا ابراهیم‌زاده و سیدعباس حقایق: مقایسه کنترل شده سیستم‌های مغزی-رفتاری بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی تثیت شده با ...
۲۰۰۶) نیز دریافتند که افراد معتاد در مقایسه با افراد الکلی و افراد بهنجار به‌طور معنی‌داری نمره بالاتری در مقایس سیستم فعال‌ساز رفتاری و خرد مقایس‌های آن داشتند.

سیستم‌های مغزی رفتاری با عود اعتیاد به این نتیجه رسیدند که ویژگی‌های زیستی خاصی به عنوان پیش‌آیندهای اعتیاد قابل طرح هستند(اوژنده، آزادفلح و طباطبائی، ۱۳۹۵). بررسی و شناسایی سیستم‌های مغزی رفتاری زمینه‌ساز در این اختلال می‌تواند به برنامه‌ریزی‌های درمانی بهتر در آن‌ها کمک کند. خصوصاً اینکه ترمیم مغزی فرایندی زمان بر است. در پژوهش‌های داخلی اشاره شده در زمینه سیستم‌های مغزی-رفتاری در اعتیاد می‌توان به نتایج پژوهش فهیمی، علی مهدی، بخشی‌پور و علیلو(۱۳۹۰) اشاره کرد که نشان داد افراد معتاد از بیش‌فعالی سیستم فعال‌ساز رفتاری برخوردارند. آزادفلح(۲۰۰۰) در بنیادهای زیستی روانی زمینه‌ساز اعتیاد، فعالیت بیشتر نظام فعال‌ساز رفتاری و فعالیت کمتر بازداری رفتاری را در گروه افراد معتاد گزارش داد. علیمرادی (۲۰۱۱) به این نتیجه دست یافت که افراد معتاد در سیستم فعال‌ساز رفتاری فعالیت بالایی دارند. با این حال این پژوهش‌ها در مقایسه بین جمعیت دچار اعتیاد و سالم انجام گرفته است و پژوهش درون‌جمعیتی در زمینه مقایسه جمعیت معتاد تثیت شده با متادون(اعتیاد کنترل شده) با جمعیت وابسته به متادون و جمعیتی که همزمان به مصرف متادون و

بیش‌ترین توجه به فعالیت نظام فعال‌ساز رفتاری معطوف است و بیش‌ترین یافته‌ها در مورد فعالیت این نظام در انسان، از مطالعات مربوط به انتقال دهنده عصبی دپامین^۱ نشات می‌گیرد (هویگ^۲ و همکاران، ۲۰۰۶). بیش‌فعالی فعال‌ساز رفتاری موجب می‌شود که فرد بدون توجه به پیامدهای عمل، به دنبال دستیابی به محرك‌های پاداش دهنده باشد(کارور، ۲۰۰۴). پژوهش‌های متعدد حاکی از بیش‌فعالی فعال‌ساز رفتاری در بروز و تداوم رفتار سوء مصرف الکل در دختران نوجوان(لکستن و داو^۳، ۲۰۰۷)، سوء مصرف الکل در زنان و مردان(پاردو، آگولار، مولینیو و توربیا^۴، ۲۰۰۷) بوده است. در پژوهش دیگری جانسون، ترونر و ایواتا^۵ (۲۰۰۳) نشان داده‌اند که سطوح بالای پاسخ‌دهی به پاداش و انگیختگی سیستم فعال‌ساز رفتاری با سوء مصرف الکل در زندگی ارتباط دارد. زیسرسون و پالفایی^۶ (۲۰۰۷) در پژوهشی با بررسی ۸۸ فرد سوء مصرف کننده سنگین الکل نشان دادند که پاسخ‌دهی و حساسیت نسبت به نشانه‌های محرك‌های اشتیاقی و تمایلی با فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری رابطه دارد. جانسون، ترونر و ایواتا (۲۰۰۳) نشان داده‌اند که سطوح بالای پاسخ‌دهی به پاداش و انگیختگی سیستم فعال‌ساز رفتاری با سوء مصرف الکل در زندگی ارتباط دارد. فرانکن و موریس^۷

1. Dopamine

2. Hewig

3. Loxton and Dawe

4. Pardo, Aguilar, Molinuevo and Torrubia

5. Johnson, Turner and Iwata

6. Zisserson and Palfai

7. Muris

قرار گرفتند با توجه به ثابت بودن دوز دارو، عدم غیبت از درمان و مصرف متادون بدون وقفه و آزمایش ادرار منفی به مدت حداقل شش ماه به عنوان معیار تشخیص این گروه در نظر گرفته شد. افراد در گروه دوم در صورت دارا بودن ملاک‌های تشخیصی وابستگی به متادون و تست منفی مورفین و دیگر مواد در مدت زمان حداقل شش ماه در این گروه قرار گرفتند و ملاک‌های ورود برای گروه سوم علاوه بر مصرف متادون، وجود آزمایش ادرار مثبت در مصرف حداقل یک ماده اعتیادآور در نظر گرفته شد. ملاک‌های ورود مشترک در هر سه گروه، داشتن سواد خواندن و نوشتن و تمایل به همکاری و ملاک خروج، عدم تمایل به ادامه همکاری در هر مرحله از پژوهش بود.

همچنین ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه شخصیت گری - ویلسون(GWPQ): مقیاس شخصیت گری - ویلسون که میزان فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری و مولفه‌های آنها را ارزیابی می‌کند، یک پرسشنامه خودارزیابی شخصیتی است که ویلسون، بارت و گری در سال ۱۹۸۹ آن را طراحی کردند. در زمینه اعتبار^۴ این آزمون، ویلسون، بارت، گری ضرایب الگای کرونباخ^۵ را برای مولفه‌های روی‌آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب

سایر موارد (ترکیبی) باشد انجام نشده است. خصوصاً اینکه درمان‌های نگهدارنده با متادون از جمله درمان‌های تایید شده در این اختلال است که مستقیماً از طریق تغییرات مغزی اثربخشی خود را نشان می‌دهد (عزیز و چانگ^۱، ۲۰۱۵، جونز^۲، ۲۰۱۳، رنر و سوزوکی^۳، ۲۰۱۰). لذا، پژوهش حاضر به منظور مقایسه سیستم‌های مغزی-رفتاری در افراد واجد تشخیص مصرف مواد افیونی تثیت شده با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی (همزمان وابسته به متادون و سایر مواد اعتیادآور) انجام شده است.

روش

پژوهش حاضر به لحاظ نوع طرح در دسته پژوهش‌های مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد واجد تشخیص مصرف مواد افیونی تثیت شده با متادون، وابسته به متادون، وابسته ترکیبی مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر اصفهان در سال ۹۵ بوده‌اند. به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد ۶۰ بیمار تثیت شده (درمان شده) با متادون، ۵۷ بیمار وابسته به متادون و ۵۷ بیمار وابسته ترکیبی (وابسته به متادون و سایر مواد همزمان) مراجعه کننده به سه کلینیک ترک اعتیاد شهرستان خمینی‌شهر، انتخاب شدند. معیارهای انتخاب افراد برای هر گروه به این صورت بود که، افرادی که در گروه تثیت در درمان نگهدارنده با متادون

4. Reliability
5. Cronbach s alpha coefficient

1. Aziz and Chang
2. Jonez
3. Renner and Suzuki

زهرا ابراهیم‌زاده و سیدعباس حقایق: مقایسه کنترل شده سیستم‌های مغزی-رفتاری بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبت شده با ... به دست آوردنده: برای مردان ۰/۰، ۶۱/۷۱، ۰/۶۵، ۰/۶۵ و برای زنان ۰/۶۸، ۰/۶۱، ۰/۰، ۰/۶۳، ۰/۷۱، ۰/۵۹، ۰/۳۵ درونی^۱ مناسب آزمون است. روایی عاملی این پرسشنامه در ایران توسط اشرفی، آزاد فلاح، طباطبائی (۱۳۸۷) انجام شد و یافته‌ها نشان داد که، روش تحلیل عاملی تنها تا حدودی ساختار پیشین پرسشنامه گری ویلسون را تایید می‌کند. این پرسشنامه شامل ۱۲۰ ماده است که برای ارزیابی فعالیت‌های هر یک از سیستم‌های بازداری رفتاری، فعال‌ساز رفتاری، جنگ و گریز، ۴۰ ماده در نظر گرفته شده است. از ۴۰ ماده مربوط به فعالیت سیستم بازداری رفتاری، ۲۰ ماده به مولفه اجتناب منفعل و ۲۰ ماده به مولفه خاموشی اختصاص دارد. از ۴۰ ماده مربوط به فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری نیز، ۲۰ ماده مربوط به اجتناب فعال، ۲۰ ماده به مولفه روی آوری اختصاص دارد. همچنین از ۴۰ ماده مربوط به فعالیت سیستم جنگ و گریز، ۲۰ ماده به مولفه جنگ و ۲۰ ماده به مولفه گریز اختصاص دارد. همچنین اشرافی ضریب آلفای کرونباخ را برای مؤلفه‌های روی‌آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به ترتیب ۰/۶۰، ۰/۵۴، ۰/۶۱، ۰/۶۶، ۰/۶۵، ۰/۶۹ و ضرایب همسانی از طریق روش دونیمه‌سازی را به ترتیب برابر ۰/۵۳، ۰/۵۷، ۰/۵۲، ۰/۶۲، ۰/۶۴، ۰/۶۴ و گزارش کرده است (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۳).

داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در قسمت توصیفی از شاخص‌هایی مانند میانگین و انحراف معیار و در قسمت استنباطی از تحلیل کوواریانس (به منظور کنترل برخی از متغیرها و بعد از بررسی پیش‌فرضها) استفاده شد.

1. Internal-consistency

جدول ۱. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سه گروه

متغیر	سطح	متادون (ثبت شده با متادون)	متادون (ثبت شده با متادون)	متادون (ثبت شده با متادون)	متغیر
	سطح	فرآوانی (درصد)	فرآوانی (درصد)	فرآوانی (درصد)	معناداری
وضعیت	متاهل	(٪۸۲/۸)۴۸	(٪۷۸/۲)۴۳	(٪۶۵/۵)۳۶	۰/۰۸۷
تأهل	مجرد	(٪۱۷/۲)۱۰	(٪۲۱/۸)۱۲	(٪۳۴/۵)۱۹	
سطح تحصیلات	دانشگاه	(٪۱۷/۹)۱۰	(٪۱۶/۴)۹	(٪۲۵/۰)۱۴	۰/۰۰۶
نوع ماده مصرفی	تریاک	(٪۹۳/۳)۵۶	(٪۷۸/۹)۴۵	(٪۸۲/۵)۴۷	۰/۰۷۴
	شیره	(٪۳۵/۰)۲۱	(٪۳۳/۳)۱۹	(٪۶۴/۹)۳۷	
	هروئین	(٪۴۸/۳)۲۹	(٪۴۰/۴)۲۳	(٪۳۸/۶)۲۲	
	ترامadol	(٪۶/۷)۴	(٪۱۴/۰)۸	(٪۲۴/۶)۱۴	
	متادون	(٪۱/۷)۱	(٪۰/۰)۰	(٪۰/۰)۰	
	الكل	(٪۵/۰)۳	(٪۳/۵)۲	(٪۰/۰)۰	
	حشیش	(٪۶/۷)۴	(٪۱/۸)۱	(٪۳/۵)۲	

جدول ۲. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سه گروه

متغیر	متادون (ثبت شده با متادون)	متادون (ثبت شده با متادون)	متادون (ثبت شده با متادون)	معناداری
	میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)	متغیر
سن	(۸/۱۲)۴۰/۷۰	(۸/۷۳)۳۵/۳۸	(۹/۲۲)۳۹/۵۹	۰/۰۰۴
مدت زمان اعتیاد	(۵/۹۳)۱۳/۰۴	(۶/۳۲)۱۱/۱۵	(۷/۱۷)۱۴/۷۸	۰/۰۱۴
مدت زمان درمان	(۳/۴۰)۵/۵۰	(۳/۳۲)۳/۷۴	(۳/۱۱)۳/۵۵	۰/۰۰۶

این پژوهش برای تحلیل نهایی داده‌های به دست آمده از تحلیل کوواریانس استفاده شده و به منظور بررسی پیش فرض‌های آماری مورد نیاز از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف برای بررسی پیش‌فرض نرمال بودن و از آزمون لوین برای بررسی پیش‌فرض تساوی واریانس‌ها، استفاده

با توجه به نتایج جداول ۱ و ۲ که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه پژوهش را در هر سه گروه نشان می‌دهد، مشخص می‌شود که بین سطح تحصیلات، سن، مدت زمان اعتیاد و مدت زمان درمان بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که در تحلیل کوواریانس کنترل شده‌اند. در

زهرا ابراهیم‌زاده و سید عباس حقایق: مقایسه کنترل شده سیستم‌های مغزی- رفتاری بین افراد وارد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبت شده با ... شد که هر دو فرض تایید شد(۰/۰۵p). با توجه به تقاضا معنادار سطح متغیرهای تحصیلات، سن، مدت زمان اعتیاد و مدت زمان درمان بین سه گروه از تحلیل کوواریانس استفاده شد. به منظور طولانی نشدن بیش از حد جدول،

از ارایه نتایج ریز هر متغیر کنترل خودداری شده و صرفا نتیجه نهایی ارایه شده است. نتایج پیش‌فرضهای آماری در جداول ۳ و ۴ و تحلیل نهایی در جدول ۵ ارایه شده‌اند.

جدول ۳. نتایج آزمون شاپیرو ویک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات

سطح معناداری	درجه آزادی	شاخص آماری	گروه
۰/۵۹۷	۶۰	۰/۹۸۴	ثبت در متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی
۰/۳۱۹	۵۷	۰/۹۷۶	
۰/۰۹۹	۵۶	۰/۹۶۵	
۰/۳۷۵	۶۰	۰/۹۷۹	ثبت در متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی
۰/۲۳۷	۵۷	۰/۹۷۳	
۰/۳۰۵	۵۶	۰/۹۷۵	
۰/۴۲۸	۶۰	۰/۹۸۰	ثبت در متادون وابسته با متادون وابسته ترکیبی
۰/۳۱۸	۵۷	۰/۹۷۶	
۰/۳۲۵	۵۶	۰/۹۷۶	
۰/۶۴۸	۶۰	۰/۹۸۵	ثبت در متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی
۰/۰۸۶	۵۷	۰/۹۶۴	
۰/۰۷۱	۵۶	۰/۹۶۱	
۰/۱۶۲	۶۰	۰/۹۷۱	ثبت در متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی
۰/۳۰۰	۵۷	۰/۹۷۶	
۰/۳۹۳	۵۶	۰/۹۷۸	
۰/۷۸۷	۶۰	۰/۹۸۷	ثبت در متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی
۰/۴۹۰	۵۷	۰/۹۸۱	
۰/۳۸۰	۵۶	۰/۹۷۸	

جدول ۴. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های سه گروه در جامعه

سطح معناداری	درجه آزادی دوم	درجه آزادی اول	آزمون لوین	متغیر
۰/۷۴۱	۱۷۱	۲	۰/۳۰۰	اجتناب فعال
۰/۶۶۷	۱۷۱	۲	۰/۴۰۶	اجتناب منفعل
۰/۳۷۳	۱۷۰	۲	۰/۹۹۲	روی آوری
۰/۱۱۰	۱۷۱	۲	۲/۲۳۹	جنگ
۰/۸۹۳	۱۷۱	۲	۰/۱۱۳	گریز
۰/۱۹۸	۱۷۱	۲	۱/۶۴۴	خاموشی

همان طور که نتایج جداول ۳ و ۴ نشان می‌دهد تایید شده است و استفاده از آزمون تحلیل واریانس در تحلیل نهایی بلامانع است. پیش‌فرضهای نرمال بودن و تساوی واریانس‌ها

جدول ۵. نتایج تحلیل کوواریانس مولفه‌های سیستم مغزی-رفتاری بین سه گروه

سطح معناداری	درجه ازادی	F	انحراف معیار	میانگین	گروه	نمودار
۰/۳۷۰	۲	۱/۰۰۴	۵/۶۱ ۵/۶۲ ۶/۰۴	۱۷/۹۶ ۱۹/۷۲ ۱۹/۵۸	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۱۰ ۱.۱۱
۰/۷۷۴	۲	۰/۲۵۶	۵/۱۶ ۵/۵ ۴/۹۱	۲۲/۳۷ ۲۳/۵۲ ۲۲/۶۰	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۱۲ ۱.۱۳
۰/۸۱۳	۲	۰/۲۰۷	۶/۰۱ ۵/۶۲ ۵/۸۲	۱۷/۱۸ ۱۹/۱۰ ۱۹/۱۴	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۱۴ ۱.۱۵
۰/۱۲۵	۲	۲/۱۱۹	۵/۳۰ ۶/۰۱ ۷/۳۴	۱۷/۵۵ ۱۸/۷۵ ۱۸/۶۵	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۱۶ ۱.۱۷
۰/۲۸۵	۲	۱/۲۶۸	۷/۱۷ ۷/۹۵ ۹/۰۳	۱۷/۰۱ ۱۹/۲۹ ۱۶/۱۱	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۱۸ ۱.۱۹
۰/۴۸۴	۲	۰/۷۳۱	۵/۷۳ ۶/۱۰ ۵/۳۴	۱۹ ۱۹/۱۶ ۱۸/۸۰	ثبت شده با متادون وابسته به متادون وابسته ترکیبی	۱.۲۰ ۱.۲۱

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری گری-ویلسون (شامل فعال‌ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ و گریز) بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثابت شده در متادون، وابسته متادون

همان طور که جدول ۵ نشان می‌دهد با توجه به ضریب F محاسبه شده، مشاهده می‌شود که بعد از کنترل متغیرهای جمعیت‌شناختی لازم، بین شش مولفه مغزی رفتاری هیچ تفاوت معناداری بین سه گروه نام برده وجود ندارد ($P>0/01$).

زهرا ابراهیم‌زاده و سیدعباس حقایق: مقایسه کترل شده سیستم‌های مغزی-رفتاری بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبت شده با ... عمل از کاهش آسیب به سمت تغییرات رفتاری و شخصیتی تغییر پیدا کرده و معنی‌دار نبودن تفاوت سیستم‌های مغزی رفتاری در این سه گروه شاید نشان از این باشد که این تغییرات بیشتر در سطوح نازل رفتاری بوده نه سطوح عمیق شخصیتی. همچنین محدودیت گزینه‌ها به صورت بلی و خیر و عدم استفاده از پاسخ‌دهی لیکرتی به خصوص در دامنه گسترده می‌تواند مانع از مشخص شدن تفاوت‌های فردی بین سه گروه شده باشد.

در تبیین‌های بالینی نتایج به دست آمده می‌توان گفت، پایین بودن انگیزه درمان، عدم آشنایی بیماران با علل روانشناختی اعتیاد و منطق درمان، عدم متابعت کافی درمانی مانند تهیه دارو از مراکز غیرقانونی و یا لغزش در کنار مصرف متادون، کاهش تدریجی انگیزه و آسیب‌پذیری بیماران طی فرایند درمانی به علت اطلاعات نادرست از منابعی خارج از سیستم درمان و معمولاً جمعیت همتایان و این باور متعارف که مصرف مواد طبیعی (مواد اعتیاد اور) به مراتب کم ضررتر از داروهای درمانی مانند متادون است می‌تواند تبیین کننده عدم مصرف متادون به شکل صحیح و استفاده مجدد از مواد اعتیاد آور باشد. عادت به رفتارهای ناسازگارانه و مبتنی بر اجرابهای اعتیادی و به تبع آن ناتوانی در حل مسائل روزمره و عادت به اینکه در رویه رو شدن با مشکلات از مواد استفاده کنند و عدم استفاده از راهبردهای مساله مدار مانند مراجعت به روانشناس و آموزش مهارت‌های زندگی و تغییر سبک

و وابسته ترکیبی (همزمان مصرف متادون و سایر مواد) صورت گرفت. در ذیل نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج تحلیل مربوط به فرضیه اصلی مبنی بر تفاوت سیستم‌های مغزی رفتاری افراد واجد تشخیص سوء مصرف مواد افیونی ثبت شده در درمان نگهدارنده با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی نشان داد که بین میانگین نمرات سیستم‌های مغزی رفتاری سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. البته معنی‌دار نشدن نتایج این پژوهش از چند جهت قابل بحث و بررسی است. در ادامه تبیین‌های احتمالی ارایه می‌شود. در تبیین روش‌شناسی نتایج این پژوهش می‌توان گفت از جهاتی استفاده از پرسش‌نامه و طبقه‌بندی شاخص‌های شخصیت شش مؤلفه به منظور سنجش تفاوت‌های گروهی در عین حال که صحیح است ولی ممکن است نتواند تفاوت‌های واقعی ولی کوچک را نشان دهد. خصوصاً اینکه مؤلفه‌های مغزی اعتیاد شامل تغییر در سطوح ساختاری و انتقال دهنده‌های عصبی اعتیاد ممکن است پیچیده‌تر از آن باشد که در پرسش‌نامه‌های خودگزارشی نشان داده می‌شود. اکثر آیتم‌های پرسش‌نامه مغزی-رفتاری گری - ویلسون، با توجه به زمینه اجتماعی به شدت متغیر بوده و از چند قابل پاسخ‌دهی است. البته توجه به این نکته مهم به نظر می‌رسد که هدف درمان نگهدارنده با متادون در بدو شروع، کاهش آسیب بوده نه تغییر رفتارهایی که باعث تغییر شخصیت این افراد شده، ولی در سال‌های اخیر انتظار از مراکز MMT در

همچنین فضای حاکم بر بسیاری از کلینیک‌ها صرفا بر اساس دریافت دارو بوده و به عبارتی پژوهش محور است و خدمات روانشناسی در این زمینه مورد کم توجهی واقع شده و اگر هم خدماتی باشد بر اساس استانداردهای علمی و بالینی تایید شده نبوده است. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت برخی از مولفه‌های سیستم‌های مغزی-رفتاری به خصوص مولفه خاموشی در آسیب‌پذیری برخی از نواحی مغزی مرتبط با اعتیاد می‌تواند نقش داشته باشد.

پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی مواجه بود که از جمله آن‌ها می‌توان به کمبود وقت و نیروی انسانی اشاره کرد که مانع از انتخاب حجم نمونه بزرگ‌تر و اجرای پرسشنامه‌های مشابهی مانند پرسشنامه خلق و منش کلونینجر شد که می‌توانست تعمیم‌دهی نتایج را افزایش دهد. همچنین عدم تعادل روحی و هشیاری در برخی از بیماران از محدودیت دیگر پژوهش حاضر بود. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، این مولفه‌های مغزی به تفکیک داروی مصرف شده (بر اساس طبقه‌بندی هشت گانه اختلالات مصرف مواد در پنجمین ویرایش کتابچه طبقه‌بندی اختلالات روانی)، مورد تحلیل آماری قرار گیرد. همچنین توصیه می‌شود به منظور افزایش توان آماری و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج، در پژوهش‌های آتی حجم نمونه بزرگ‌تری انتخاب انجام شود.

زندگی، نیز می‌تواند تبیین کننده این مشکلات باشد و باعث تحریک نامناسب سیستم‌های فعال‌ساز رفتاری و یا سیستم‌های بازدارنده رفتاری شود.

دراک بیماری و درمان به عنوان یک مشکل جدی، که گریبان‌گیر تمام تیم درمان و من جمله بیماران است و بسیار دیده شده که برخی از بیماران فقط در ساعت‌ها کم رفت و آمد در طول روز به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده و به سرعت خواهان گرفتن دارو و ترک کلینیک نموده و از حضور در جلسات فردی و به خصوص جلسات گروهی خودداری می‌کنند. دشواری دسترسی به درمان و انعطاف‌ناپذیری برنامه درمانی می‌تواند یکی دیگر از علل مصرف مجدد مواد یا عدم استفاده از داروها باشد. به عنوان مثال، قوانین و مقررات بعضاً کلیشه‌ای و خشک پروتکل و مداخلات روانشناسی نامنطبق و نامنعطف در روند کار درمانی و مداخلات اثر بخش‌تر از حیث روانشناسی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و فرد را در معرض مجدد مواد و تغییرات مغزی منفی گسترش‌های تر می‌کند. لازم به ذکر است که مسئله نامنعطف بودن مداخلات و تطبیق شرایط درمان با هر یک از مراجعان در بد و ورود بیماران به کلینیک‌ها و رفتار تیم درمان بسیار حائز اهمیت و باید بر اساس حسن همدردی و ایجاد رابطه درمانی-که معمولاً افراد بیمار با رفتارهای تحقیرآمیزی مواجه می‌شوند- سازگار شود.

منابع

- و سلامت روان. تهران: انتشارات بعثت.
- فرهودیان، ع.، مکری، آ.، اختیاری، ح.، صفاتیان، س.، صادقی، م و دولتشاهی، ب. (۱۳۹۰). پایان درمان نگهدارنده با متادون. تهران: انتشارات مهر و ماه.
- فهیمی، صمد.، علی مهدی، منصور.، بخشی پور رودسری، عباس و علیلو، مجید محمود. (۱۳۹۰). الگوی زیستی شخصیت گری و اعتیاد. فصلنامه اندیشه و رفتار، ۲۲(۶)، ۵۱-۶۰.
- Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (2010). The role of the Behavioral Approach System (BAS) in bipolar spectrum disorders. Current Directions in Psychological Science, 19(3), 189–194.
- Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Grandin, L. D., Hughes, M. E., Hogan, M. E. (2008). Behavioral Approach System and Behavioral Inhibition System sensitivities and bipolar spectrum disorders: Prospective prediction of bipolar mood episodes. Bipolar Disorders, 10, 310–322.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- آزاد فلاح، پ.، دادستان، پ.، اژه‌ای، ج و موذنی، م. (۱۳۷۸). تنیدگی، فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری و تغییرات ایمونوگلوبولین A. مجله روانشناسی، ۹، ۲۴۹-۲۶۸.
- اوژنند، ح.، آزاد فلاح، پ و رسول‌زاده طباطبائی، ک. (۱۳۹۵). بررسی نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری با عود اعتیاد. فصلنامه پژوهش در پزشکی، ۵۷، ۴۰-۵۴.
- فتحی‌آشتیانی، ع.، داستانی، م. (۱۳۸۸). آزمون‌های روانشناسی: ارزشیابی شخصیت Azadfallah, P(2000).The biopsychic basics of addiction. Journal of psychology.(15),234-246.
- Alimoradi, L. (2011). The Comparing Activity of Brain/Behavioral Systems and Mental Health in Normal and Addict's Individuals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1703-1708.
- Aziz, Z., & Chong, N. J. (2015). A satisfaction survey of opioid-dependent patients with methadone maintenance treatment. Journal of substance abuse treatment, 53, 47-51.
- Brook, D. M., & Spitz, H. I. (2002). The group therapy of substance abuse. New York: The Howrth Medical Press.
- Bowen, MT., Neumann, ID. (2017). Rebalancing the Addicted Brain: Oxytocin Interference with the

- Neural Substrates of Addiction. Trends in Neurosciences, 40, 691-708.
- Carver. (2004). Negative Affects Deriving From the Behavioral Approach System. *American Psychological Association*, 4(psychology), 2.
- Desjardins, J., Zeleneski, J.M., & Coplan, R.J. (2008). An Investigation of Maternal Personality, Parenting and Subjective Well-Being. *Personality and Individual Differences*, 44(psychology), 3.
- Franken, I. H., Muris, P., & Georgieva, I. (2006). Gray's model of personality and addiction. *Addictive behaviors*, 31(3), 399-403.
- Greene, J.D., Nystrom, L.E., Engell, A.D., Darley, J.M., Cohen, J.D. (2004). The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment. *Neuron*, 44, 389-400.
- Hewig, J., Hagemann, D., Seifert, J., Naumann, E., & Bartussek, D. (2006). The relation of cortical activity and BIS/BAS on the trait level. *Biological Psychology*, 71(Psychology), 4.
- Jones, H. E. (2013). Treating opioid use disorders during pregnancy: historical, current, and future directions. *Substance abuse*, 34(2), 89-91.
- Jose, M. G., Flor, Z. B., & Francisca, L. R. (2007). The role of personality variables in drug abuse in a Spanish university population. *Journal Mental Health Addiction*, 7 (3), 475-487.
- Kelly, T. H., Robbins, G., Martin, G. A., Fillmor, M. T., Lane S. D., Harrington N. G, Rush C. R. (2006). Individual differences in drug abuse vulnerabilityamphetamine and sensation-seeking status. *Psychopharmacology*, 18, 17-25.
- Khosravani, V., Seidifarouei, M., & Alvani, A. (2016). Early maladaptive schemas, behavioral inhibition system, behavioral approach system, and defense styles in natural drug abusers. *Polish Annals of Medicine*, 23(1), 6-14.
- Loxton, N. J., & Dawe, S. (2007). How do dysfunctional eating and hazardous drinking women perform on behavioural measures of reward and punishment sensitivity? *Pers Individ Dif*, 42, 1163-1172.
- Li, Y., Xu, Y., & Chen, Z. (2015). Effects of the behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS), and emotion regulation on depression: A one-year follow-up study in Chinese adolescents. *Psychiatry research*, 230(2), 287-293.
- Pardo Y., Aguilar R., Molinuevo B., Torrubia R. (2007). Alcohol use as a behavioural sign of disinhibition: evidence from J.A. Gray's model of personality. *Addict Behav.* ;32(10):2398-403.

زهرا ابراهیم‌زاده و سید عباس حقایق: مقایسه کنترل شده سیستم‌های مغزی- رفتاری بین افراد وارد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی ثبت شده با ...

- Park, S. M., Park, Y. A., Lee, H. W., Jung, H. Y., Lee, J.-Y., & Choi, J.-S. (2013). The effects of behavioral inhibition/approach system as predictors of Internet addiction in adolescents. *Personality and Individual Differences*, 54(1), 7-11.
- Pascalis, V. D., Arwae, I. B., Matteucci, S., & Mazzocco, A.M. (2005). Effects of emotional visual stimuli on auditory information processing: a test of J.A. Gray's reinforcement sensitivity theory. *Personality and Individual Differences*, 38(psychology).
- Renner, J. A., & Suzuki, J. (2010). Opiates and Prescription Drugs. *Addiction Medicine* (pp. 463-493): Springer.
- Sommer, K., Maurits W., Vilfredo, M. (2015). BIS/BAS sensitivity and emotional modulation in a prepulse-inhibition paradigm: A brain potential study. *Physiology & Behavior*. (Physiology), 23.
- Sullivan EV, Pfefferbaum A. (2005) Neurocircuitry in alcoholism: a substrate of disruption and repair. *Psychopharmacology* (Berl) 180:583–94.
- Wallas J.(2003).Theory of 12-steps oriented in treatment. Treating substance abuse: Theory and technique (pp. 9-31). New York: The Guilford Press.